

# Bagi Penerima Penyuntikan Vaksinasi Corona






~ Jaga kesehatan hingga beberapa hari setelah penyuntikan ~

Setelah menerima penyuntikan, **duduk istirahat selama 15 menit di lokasi vaksinasi & pantau keadaan tubuh.**

## Gejala yang mungkin timbul

Vaksin yang digunakan di Jepang disuntikkan ke otot, karenanya sebagian besar penerima akan mengalami efek samping ringan seperti rasa sakit dan bengkak yang akan **hilang setelah beberapa hari. Jika diperlukan minum obat demam dsb, dan pantau keadaan tubuh.** (Persentase penerima vaksin yang mengalami gejala efek samping berat **sangatlah kecil.**)

### 【Gejala Pasca Vaksinasi】

Gejala								
	Perih	Bengkak	Diare	Nyeri Otot	Nyeri Sendi	Sakit Kepala	Lesu	Meriang

Penyuntikan vaksin di Jepang dilakukan 2 kali. Gejala-gejala di atas **timbul lebih banyak di penyuntikan kedua.** Gejala juga **lebih sering muncul pada penerima non lansia dari pada lansia.** Gejala efek samping merupakan bukti bahwa sistem imun tubuh Anda bekerja.

Jika gejala di atas berkelanjutan atau Anda merasa gejala menimbulkan efek buruk lainnya pada tubuh, **mohon hubungi RS Anda atau pusat konsultasi Prefektur Osaka.**

Jika rasa sakit, bengkak, atau demam parah, harap periksa ke pihak RS/dokter.

Penyusun

Osaka International Network

☎06-6966-2400

Pamflet ini disusun oleh Osaka International Network dengan kerja sama oleh Prefektur Saitama.

## Gejala berat yang mungkin timbul

### 【Gejala dan Lama Gejala】

■ Walau kemungkinan terjadi sangat kecil, terkadang dalam 5 menit, rata-rata dalam 30 menit setelah penyuntikan, jika gejala-gejala di bawah ini timbul, kemungkinan disebabkan oleh anafilaksis atau syok.



- Gatal-gatal
  - Urtikaria
  - Eritema
  - Kulit merah
- dsb



- Sakit perut,
  - mual,
- dsb



- Kelainan
- penglihat-
- an



- Suara serak
  - Bersin
  - Kerongkong-an
  - gatal
  - Sulit bernapas
- dsb




- Pucat
  - Kesadaran
  - melemah
- dsb

Istirahatlah sejenak di lokasi setelah penyuntikan dan **jika gejala-gejala di atas muncul mohon untuk menginformasikan ke petugas kesehatan di lokasi secepatnya.**

■ Jika gejala muncul **setelah Anda meninggalkan lokasi penyuntikan, hubungi pusat konsultasi vaksinasi 24 jam yang** telah disediakan oleh Prefektur Osaka.

### Jika timbul gejala berat

Pusat Konsultasi Vaksinasi Corona Osaka

 0570-012-336/06-6635-2047

24 Jam Tersedia di Hari Libur, Sabtu, Minggu juga

※Hanya Bahasa Jepang



Info terbaru  
& lebih lengkap  
(Pref.Osaka)

Penyusun

Osaka International Network

☎06-6966-2400

Pamflet ini disusun oleh Osaka International Network dengan kerja sama oleh Prefektur Saitama.