

吹田市多语言一站式咨询中心

长时间持续的咳嗽，有可能是肺结核

長引く咳は、結核かもしれません

结核病、由于吸入结核患者的咳嗽、打喷嚏等原因而排出在空气中的病菌造成的感染，最常见的是肺部感染。肺结核的症状是，咳嗽，咳痰，发热，痰中带血，胸痛，乏力，盗汗，体重减轻等。

「持续2周以上的咳嗽」「多痰」「乏力」「体重减轻」等、有自觉症状、请尽早去医院就诊。

另外，为了尽早发现结核，学校以及工作场所安排的体检，请一定接受胸部X光检查。如果没有接受X光检查的机会，请参加市里安排的「结核病筛查（65岁以上）」「肺癌筛查（40岁以上）」

确诊为结核病需要治疗的情况，有持续安心治疗的医疗费公费报销制度。详情、请在以下的网页链接查看。

■手册

有关结核病信息汇总手册。有多种语言的说明。

<https://www.pref.osaka.lg.jp/o100050/iryu/osakakansensho/yoshikipanhu.html>

■网页链接

有关结核病

<https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018600/1018623/1024896/1015240.html>

有关成年人的各项体检

<https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018600/1018601/1018602/index.html>

■问讯处

健康医疗部 地域保健科

电话：06-6339-2227

如果有不明白的地方，请向吹田市多文化共生一站式咨询服务中心咨询。